

	ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL TT GLICEROLATO	Allegato 10 SOP-BC-PT-13 Rev.01 In vigore da 29 Aprile 2017 Valida fino a 29 Aprile 2022
---	---	---

COPIA
28.04.2014

INFORMAZIONI GENERALI

I lembi di tessuto tegumentario vanno applicati nel rispetto dei principi di sterilità.

I lembi di tessuto tegumentario consegnati devono essere applicati esclusivamente sul paziente per il quale sono stati richiesti.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E DI TRASPORTO

I lembi consegnati glicerolati sono conservati in contenitori con soluzione di glicerolo all'85%.

È da ricordare che tutti i lembi hanno subito una procedura di decontaminazione in soluzione antibiotata.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE RACCOMANDATE

I contenitori dei lembi di tessuto tegumentario glicerolato devono essere conservati a 4°C.

PROCEDURA DI SGLICEROLIZZAZIONE

Per sglicerolare i lembi di tessuto tegumentario occorre effettuare i passi seguenti.

1. Preparare:
 - 3 arcelle sterili
 - Circa 900 ml di soluzione fisiologica
2. Scaldare la soluzione fisiologica a 37°C (per facilitare l'eliminazione del glicerolo dal tessuto)
3. Riempire le 3 arcelle con circa 250-300 ml di soluzione fisiologica riscaldata
4. Effettuare lavaggi sequenziali di circa 5 minuti nelle diverse arcelle.

