

I criteri per la selezione dei donatori sono quelli della Direttiva 2006/17/CE del Parlamento Europeo, ulteriormente dettagliati dall'ASR66/CSR 2018.

Fasi donazione cornee

- Protezione degli occhi: mantenere sempre le palpebre chiuse, coperte con garze inumidite (soluzione fisiologica)
- Posizione della testa: mantenere sollevata di 30°, prima e dopo il prelievo
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- Espressione di volontà alla donazione
- Accertamento/Certificazione di morte
- Identificazione del donatore
- Eventuale nulla osta Procura della Repubblica
- Valutazione dell'emodiluizione
- Scheda segnalazione prelievo
- Richiesta esami sierologici:
 - HBsAg
 - HBcAb
 - Ab HIV 1 e 2
 - Ab HCV
 - Ab anti-Treponema o TPHA
- Chiamata prelevatore
- Intervallo morte-prelievo raccomandato 6-8 ore dall'arresto di circolo (limite 24 ore)
- Foglio di accompagnamento cornee
- Foglio di trasporto cornee

Fasi prelievo cornee

- Verifica presenza moduli: espressione volontà, accertamento/certificazione morte, identificazione del donatore, scheda di segnalazione prelievo
- Se uno o più di questi documenti non sono presenti, il medico prelevatore deve:
 - procedere immediatamente all'acquisizione degli stessi dalla struttura che ha coordinato la donazione
oppure
 - chiedere che vengano raccolti e ritornare per il prelievo quando siano presenti presso la sede del prelievo
oppure
 - chiamare il Riferimento per prelievo dei tessuti oculari 335.1328099 per concordare la modalità più adatta alla situazione
- Completamento dell'identificazione del donatore
- Prelievo delle cornee
- Completamento scheda segnalazione prelievo cornee e fogli di accompagnamento e trasporto
- Imballaggio, conservazione e spedizione