

	<p align="center">ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL TT GLICEROLATO</p>	<p>Allegato 10 SOP-BC-PT-13 Rev.02 In vigore da 29 Aprile 2022 Valida fino a 29 Aprile 2027</p>
---	---	---

COPIA
29 APR. 2022

INFORMAZIONI GENERALI

I lembi di tessuto tegumentario vanno applicati nel rispetto dei principi di sterilità.

I lembi di tessuto tegumentario consegnati devono essere applicati esclusivamente sul paziente per il quale sono stati richiesti.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E DI TRASPORTO

I lembi consegnati glicerolati sono conservati in contenitori con soluzione di glicerolo all'85%.

È da ricordare che tutti i lembi hanno subito una procedura di decontaminazione in soluzione antibiotata.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE RACCOMANDATE

I contenitori dei lembi di tessuto tegumentario glicerolato devono essere conservati a 4°C.

PROCEDURA DI SGLICEROLIZZAZIONE

Per sglicerolare i lembi di tessuto tegumentario occorre effettuare i passi seguenti.

1. Preparare:

3 arcelle sterili

Circa 900 ml di soluzione fisiologica

2. Scaldare la soluzione fisiologica a 37°C (per facilitare l'eliminazione del glicerolo dal tessuto)

3. Riempire le 3 arcelle con circa 250-300 ml di soluzione fisiologica riscaldata

4. Effettuare lavaggi sequenziali di circa 5 minuti nelle diverse arcelle.

R